

# Lac®-Ophtal® Gel sine

DR. WINZER

Liebe Anwenderin, lieber Anwender,  
mit Lac®-Ophtal® Gel sine haben Sie sich für ein Produkt entschieden, das Ihre Augenoberfläche intensiv befeuchtet und beruhigt. Somit werden die subjektiven Anzeichen einer Benetzungsstörung lang anhaltend gelindert.

Lac®-Ophtal® Gel sine eignet sich zur intensiven Befeuchtung des Auges. Konservierungsmittelfrei.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig – sie enthält wichtige Informationen zur Anwendung von Lac®-Ophtal® Gel sine. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Apotheker, Ihren Arzt oder gern auch an uns.

Dr. Winzer wünscht Ihnen und Ihren Augen alles Gute!

## Inhaltsstoffe:

Jedes 0,6 ml Einzeldosisbehältnis enthält 0,2% Carbomer, Sorbitol, Natriummonohydrogenphosphat-Dodecahydrat, Natriumhydroxid, Wasser und ist konservierungsmittelfrei.

## Wann sollten Sie Lac®-Ophtal® Gel sine benutzen?

Lac®-Ophtal® Gel sine beruhigt intensiv die Augen. Es verbessert die Befeuchtung der Augenoberfläche bei starkem Trockenheitsgefühl, Brennen oder Müdigkeit der Augen, verursacht z. B. durch langes Fernsehen oder Bildschirmarbeit, Heizungsluft oder Klimaanlage.


## Wie wenden Sie Lac®-Ophtal® Gel sine an?

Je nach Bedarf tropfen Sie 1-2 Geltropfen in jedes Auge. Lac®-Ophtal® Gel sine ist täglich beliebig häufig anwendbar. Es wird empfohlen, sich vor der Anwendung von Augentropfen die Hände zu waschen.


Es wird empfohlen nach dem Eintropfen mehrmals zu blinzeln, dadurch kann sich der Tropfen optimal auf der Augenoberfläche verteilen. Die einfache und problemlose Anwendung entnehmen Sie bitte den Abbildungen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie das Einzeldosis-Behältnis beim Tropfen möglichst senkrecht halten und eine Berührung mit dem Auge vermeiden.




1. Bitte ziehen Sie ein Einzeldosis-Behältnis ab und fassen dieses an der Etikettseite an.



2. Bitte schlagen Sie das Einzeldosis-Behältnis einige Male mit der Hand nach unten aus bis sich die gesamte Gel-Menge im Hals des Einzeldosis-Behältnisses befindet.



3. Entfernen Sie durch Drehen den Kopf des Einzeldosis-Behältnisses.



4. Bringen Sie jetzt das Einzeldosis-Behältnis senkrecht über dem Auge in Position und geben Sie in jedes Auge 1-2 Tropfen.

## Gegenanzeigen:

Bitte benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe überempfindlich reagieren.

## Vorsichtsmaßnahmen:

- Beim Auftreten von Reizungen und Unverträglichkeiten das Produkt nicht mehr anwenden.
- Um Verunreinigungen zu vermeiden, sollten Sie die Tropferspitze nicht berühren und direkten Kontakt mit dem Auge und der Kontaktlinse vermeiden.
- Einzeldosis-Behältnis nach dem Gebrauch entsorgen.
- Bei Anwendung unterschiedlicher Präparate am Auge sollten diese in einem Abstand von ca. 15 min. getropft werden.
- Überprüfen Sie vor der ersten Anwendung den Inhalt der Verpackung. Verwenden Sie keine bereits geöffneten oder beschädigten Einzeldosis-Behältnisse.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr nach Ablauf des Verwendbarkeitsdatums.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Nur zur Anwendung am Auge.

## Warnhinweise:

Es ist wichtig, dass Sie die Hinweise in dieser Gebrauchsanweisung für eine richtige Anwendung der Augentropfen beachten.

Weiter bestehende oder zusätzlich auftretende Augenprobleme sollten medizinisch abgeklärt werden. Wenn das Auge schmerzt, entzündet und gerötet ist, entfernen Sie Ihre Kontaktlinsen und suchen Sie einen Arzt auf.

## Welche Packungen sind erhältlich?

Lac®-Ophtal® Gel sine gibt es in den Packungen mit 30, 60 oder 120 Einzeldosis-Behältnissen mit je 0,6 g Gel.

Anzeige

## ANFORDERUNGSCOUPON

Fax: 030 – 33 0 93 – 305

Liebe Anwenderin, lieber Anwender,  
mit diesem Anforderungscoupon können Sie sich gern kostenlos unsere **mehrsprachige** Informationsbroschüre zum Thema „Trockenes Auge“ bestellen. Darin enthalten sind Informationen und Tipps in **deutscher, englischer, italienischer und türkischer, arabischer** als auch **russischer** Sprache.

Senden Sie uns einfach Ihre Adresse per Post, Fax oder E-Mail oder rufen Sie an und Sie erhalten umgehend Ihre Broschüre.

### Dr. Winzer Pharma

Service „Trockenes Auge“  
Brunsbütteler Damm 165-173  
13581 Berlin

**Tel.:** 030 – 33093 – 5070

**Fax:** 030 – 33093 – 305

**E-Mail:** service@drwinzer.de

Bitte senden Sie die Broschüre an folgende Adresse:



Dr. Robert Winzer Pharma GmbH,  
 Brunsbütteler Damm 165 - 173, D-13581 Berlin  
 Tel: 030 – 330 93 – 5070, Fax: 030 – 330 93 – 305,  
 E-Mail: service@drwinzer.de



Sterilisationsverfahren,  
 Aseptisch



Obere Temperaturbegrenzung 25 °C.



Nicht zur Wiederverwendung.



Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.



Gebrauchsanweisung beachten!



Verwendbar bis:



Chargenbezeichnung



Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren!

**Lac®-Ophtal® Gel sine, 2009-05**

84216 PB 280/1/CE

Weitere Informationen zu Lac®-Ophtal® Gel sine

Anzeige

**Welche Bedeutung hat die Tränenflüssigkeit?**

Die natürliche Tränenflüssigkeit wird mit jedem Lidschlag auf der Augenoberfläche verteilt, um dort das Auge vor dem Austrocknen zu schützen, bei der Heilung von oberflächlichen Verletzungen der Hornhaut zu helfen und Hornhautschäden vorzubeugen. Eine gestörte Tränenproduktion äußert sich durch unterschiedliche Beschwerden, wie z. B. Trockenheitsgefühl, Brennen oder ein Fremdkörpergefühl im Auge, gereizte und gerötete Augen, verklebte Augen am Morgen und in manchen Fällen auch tränende Augen.

**Wie kann Lac®-Ophtal® Gel sine Ihren Augen helfen?**

Lac®-Ophtal® Gel sine verbessert die Stabilität des Tränenfilms. Ihre Augen sind für eine längere Zeit mit wohlthuender und beruhigender Feuchtigkeit versorgt.

**Und das können Sie persönlich tun:**

- Lüften Sie mehrmals täglich gründlich.
- Trinken Sie ausreichend (mind. 2 Liter täglich).
- Halten Sie sich häufig an frischer Luft auf.
- Richten Sie Gebläse, bspw. im Auto, nicht auf die Augen.
- Legen Sie Pausen bei der Bildschirmarbeit ein.

Lac®-Ophtal®		ohne Konservierungsstoffe
<b>Lac®-Ophtal® system</b> mit 2% Povidon	Angenehme Erfrischung und Befeuchtung bei leichtem, gelegentlich auftretendem Trockenheitsgefühl	<input checked="" type="checkbox"/> innovatives Tropfsystem <input checked="" type="checkbox"/> 12 Wochen nach Anbruch haltbar
<b>Lac®-Ophtal® MP sine</b> mit 2% Povidon		<input checked="" type="checkbox"/> Einzeldosisbehältnis <input checked="" type="checkbox"/> praktisch für unterwegs
<b>Lac®-Ophtal® MP</b> mit 2% Povidon		<input type="checkbox"/> Standard-Tropfflasche
<b>Lac®-Ophtal® Gel sine</b> mit 0,2% Carbomer	Langanhaltende intensive Befeuchtung bei starkem Trockenheitsgefühl – auch ideal für die Anwendung über Nacht	<input checked="" type="checkbox"/> Einzeldosisbehältnis <input checked="" type="checkbox"/> praktisch für unterwegs
<b>Lac®-Ophtal® Gel</b> mit 0,2% Carbomer		<input type="checkbox"/> Standard-Tropfflasche

Anzeige

**Ihre Meinung ist uns wichtig!**

**1. Wie sind Sie auf Lac®-Ophtal® Gel sine aufmerksam geworden?**

- Empfehlung des Arztes, Fachrichtung: \_\_\_\_\_
- Empfehlung des Apothekers     Empfehlung von Verwandten oder Bekannten
- Werbung     Sonstiges: \_\_\_\_\_

**2. Aus welchem Grund wenden Sie Lac®-Ophtal® Gel sine an?**

- Zur Linderung gereizter Augen     Zur Befeuchtung der Augen
- Anderer Grund: \_\_\_\_\_

**3. Wie beurteilen Sie Lac®-Ophtal® Gel sine hinsichtlich folgender Punkte?**

- Beruhigung der Augen:     sehr gut    gut    weniger gut    schlecht
- Befeuchtung der Augen:     sehr gut    gut    weniger gut    schlecht
- Verträglichkeit:     sehr gut    gut    weniger gut    schlecht
- Praktische Handhabbarkeit
- der Einzeldosis-Behältnisse:     sehr gut    gut    weniger gut    schlecht

**4. Falls Sie Kinder haben, nutzen Sie Lac®-Ophtal® Gel sine auch für diese?**

- ja, Alter der Kinder \_\_\_\_\_     nein

**5. Soziodemographische Angaben für statistische Zwecke:**

Geschlecht:  weiblich     männlich    Alter: \_\_\_\_\_

Ja, ich gebe meine Einwilligung, dass meine Daten bei Dr. Robert Winzer Pharma GmbH gespeichert werden. Die Daten werden ausschließlich anonymisiert gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben. Diese Einwilligung kann ich jederzeit schriftlich widerrufen.

Datum: .....    Unterschrift: .....